

Escala de Child-Pugh para severidad de hepatopatía

Gastroenterología / Hepatología / Cirugía · Puntuación de 5 a 15 · Marque una opción por apartado

Paciente / identificación	Fecha y hora	Profesional que valora

Bilirrubina total (mg/dL) · Valor analítico de bilirrubina	
☐ < 2	1
☐ 2–3	2
☐ > 3	3

Albúmina sérica (g/dL) · Valor analítico de albúmina	
☐ > 3.5	1
☐ 2.8–3.5	2
☐ < 2.8	3

INR / Tiempo Protrombina · Estado de la coagulación	
☐ INR < 1.7	1
☐ INR 1.7–2.3	2
☐ INR > 2.3	3

Ascitis · Presencia de líquido en cavidad abdominal	
☐ Ninguna	1
☐ Leve (o controlada con diuréticos)	2
☐ Moderada / Tensa	3

Encefalopatía hepática · Grado de afectación neurológica	
☐ Ninguna	1
☐ Grado I-II — Alteración leve del sueño, confusión	2
☐ Grado III-IV — Estupor, coma	3

Puntuación total: / 15	Mín. 5 · Máx. 15
------------------------------------	------------------

Interpretación de la puntuación	
5–6	Grado A (Compensada) — Buen pronóstico. Supervivencia al año ~100%.
7–9	Grado B (Deterioro funcional) — Supervivencia al año ~80%. Considerar para trasplante hepático.
10–15	Grado C (Descompensada) — Mal pronóstico. Supervivencia al año ~45%.

Referencias

- Pugh RN, et al. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. Br J Surg. 1973;60(8):646-9.