

Escala CURB-65 para Severidad de Neumonía

Neumología / Urgencias / Medicina Interna · Puntuación de 0 a 5 · Marque todos los ítems presentes

Paciente / identificación	Fecha y hora	Profesional que valora

Criterios CURB-65		
☐	Confusión — Nueva confusión mental (AMTS <= 8 o desorientación)	1
☐	Urea > 7 mmol/L — Urea > 7 mmol/L (> 42 mg/dL; BUN > 19 mg/dL)	1
☐	Frecuencia Respiratoria >= 30 rpm — Taquipnea marcada	1
☐	Presión Arterial Baja — Sistólica < 90 mmHg o Diastólica <= 60 mmHg	1
☐	Edad >= 65 años — Paciente de edad avanzada	1

Puntuación total: / 5	Mín. 0 · Máx. 5
-----------------------------------	-----------------

Interpretación de la puntuación

0-1	Riesgo bajo — Mortalidad < 3%. Valorar tratamiento ambulatorio.
2	Riesgo moderado — Mortalidad ~9%. Valorar ingreso hospitalario corto o seguimiento estrecho.
3-5	Riesgo alto — Mortalidad 15-40%. Ingreso hospitalario obligatorio. Considerar UCI si puntuación es 4-5.

Referencias

- Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003;58(5):377-82.

Hoja de registro de [escalasclinicas.es](#). Calculadora online con interpretación, preguntas frecuentes y escalas relacionadas: [escalasclinicas.es/escala/curb65](#). Herramienta de apoyo: no sustituye el criterio clínico ni las guías de práctica clínica.