

Escala de coma de Glasgow pediátrica (PGCS)

Pediatría / Urgencias pediátricas / UCI pediátrica / Neurocirugía · Puntuación de 3 a 15 · Marque una opción por apartado

Paciente / identificación	Fecha y hora	Profesional que valora

Apertura ocular (E) · Idéntico a la escala adulta

- | | |
|---|---|
| ☐ Espontánea — Abre los ojos espontáneamente | 4 |
| ☐ Al estímulo verbal — Abre los ojos al hablarle o al tocarle suavemente | 3 |
| ☐ Al dolor — Abre los ojos ante estímulo doloroso | 2 |
| ☐ Ninguna — No abre los ojos | 1 |

Respuesta verbal pediátrica (V) · Adaptada al desarrollo del lenguaje infantil

- | | |
|---|---|
| ☐ Sonríe, sigue, vocaliza — Sonríe, sigue objetos, balbucea o vocaliza apropiadamente para su edad | 5 |
| ☐ Llanto consolable — Irritable con llanto que se calma con el contacto con los padres | 4 |
| ☐ Llanto inconsolable — Llanto persistente que no se calma con los padres | 3 |
| ☐ Quejidos — Gemidos o quejidos inespecíficos sin llanto estructurado | 2 |
| ☐ Ninguna — Ausencia total de respuesta verbal | 1 |

Respuesta motora pediátrica (M) · Adaptada para lactantes sin capacidad de obedecer órdenes verbales

- | | |
|--|---|
| ☐ Movimientos espontáneos normales — Movimientos espontáneos adecuados a la edad del niño | 6 |
| ☐ Retirada al tacto — Retirada localizada ante el tacto o estímulo suave | 5 |
| ☐ Retirada al dolor — Retirada inespecífica ante estímulo doloroso | 4 |
| ☐ Flexión anormal (decorticación) — Postura de decorticación | 3 |
| ☐ Extensión (descerebración) — Postura de descerebración | 2 |
| ☐ Ninguna — Sin respuesta motora | 1 |

Puntuación total: _____ / 15

Mín. 3 · Máx. 15

Interpretación de la puntuación

- | | |
|-------|---|
| 13–15 | Leve (13-15) — TCE pediátrico leve (13-15). Un PGCS 15 es la respuesta normal para la edad. Observación en urgencias y reglas PECARN para decidir el TC craneal. |
| 9–12 | Moderado (9-12) — TCE pediátrico moderado. Ingreso hospitalario, monitorización neurológica, TC craneal urgente. |
| 3–8 | Grave (≤8) — TCE pediátrico grave / coma. Valorar intubación por profesional con experiencia en vía aérea pediátrica y manejo en UCI pediátrica. TC craneal urgente. |

Avisos clínicos

- | | |
|------|--|
| ≤ 8 | Intubación pediátrica — PGCS ≤ 8: indicación de intubación endotraqueal. Requerir profesional con experiencia en vía aérea pediátrica. Ingreso en UCI pediátrica. |
| ≥ 14 | Aplicar reglas PECARN — En TCE leve con PGCS 14-15, aplicar reglas PECARN para decidir necesidad de TC craneal y minimizar radiación ionizante. |

Referencias

- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974;2(7872):81-84.
- Holmes JF, Palchak MJ, MacFarlane T, Kuppermann N. Performance of the Pediatric Glasgow Coma Scale in children with blunt head trauma. Acad Emerg Med. 2005;12(9):814-819.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. Lancet. 2009;374(9696):1160-1170.

Hoja de registro de escalasclinicas.es. Calculadora online con interpretación, preguntas frecuentes y escalas relacionadas: escalasclinicas.es/escala/glasgow-pediatrico. Herramienta de apoyo: no sustituye el criterio clínico ni las guías de práctica clínica.