

Escala qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment)

Urgencias / UCI / Medicina Interna · Puntuación de 0 a 3 · Marque todos los ítems presentes

Paciente / identificación	Fecha y hora	Profesional que valora

Criterios qSOFA		
☐	Alteración del nivel de consciencia — Escala de Glasgow < 15	1
☐	Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg — Hipotensión	1
☐	Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm — Taquipnea	1

Puntuación total: / 3	Mín. 0 · Máx. 3
-----------------------------------	-----------------

Interpretación de la puntuación

0–1	Riesgo bajo — Probabilidad baja de mala evolución por sepsis. Reevaluar si hay cambios clínicos.
2–3	Riesgo elevado — Alto riesgo de mala evolución. Considerar sepsis, monitorización estrecha y posible traslado a UCI.

Referencias

- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10.

Hoja de registro de [escalasclinicas.es](#). Calculadora online con interpretación, preguntas frecuentes y escalas relacionadas: [escalasclinicas.es/escala/qsoba](#). Herramienta de apoyo: no sustituye el criterio clínico ni las guías de práctica clínica.